

อำเภอ	คัดกรอง DM / HT ≥ ร้อยละ 90		ตรวจติดตามกลุ่ม สงสัยป่วยโรค DM/ HT ≥ ร้อยละ 80		ผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจ HbA1C และควบคุมได้ดี ≥ ร้อยละ 70/40		ผู้ป่วย HT ควบคุมได้ดี ≥ ร้อยละ 60	ผู้ป่วย DM / HT ได้รับ การประเมิน (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 90
	DM ≥ ร้อยละ 90	HT ≥ ร้อยละ 90	DM ≥ ร้อยละ 80	HT ≥ ร้อยละ 80	HbA1C ≥ ร้อยละ 70	DM ≥ ร้อยละ 40	HT ≥ ร้อยละ 60	CVD Risk ≥ ร้อยละ 90
เมืองพังงา	88.8 (+0.02)	87.44 (+0.07)	81.96 (+40.51)	99.85 (+0)	67.72 (+15.65)	32.12 (+8.46)	42.72 (+4.69)	95.55 (+2.64)
เกาะยาว	92.36 (+0.04)	93.33 (+0.09)	75.38 (+7.85)	99.62 (+1.79)	75.37 (-0.38)	25.85 (-0.04)	54.85 (+2)	88.08 (+17.6)
กะปง	92.42 (+0)	91.74 (+0.01)	86.72 (+6.25)	94.06 (+0.31)	62.16 (+0.79)	26.06 (+0.5)	52.69 (+1.65)	91.03 (+0.01)
ตะกั่วทุ่ง	93.24 (+0.1)	93.01 (+0.11)	92.28 (+17.69)	95.98 (+4.42)	57.93 (+6.82)	35.6 (+3.15)	52.19 (+0.84)	82.79 (+0.72)
ตะกั่วป่า	91.23 (+0.4)	90.76 (+0.27)	82.14 (+22.62)	98.25 (+0.09)	63.96 (+3.11)	28.68 (+1.78)	52.77 (+1.67)	90.36 (+0.92)
คุระบุรี	92.62 (+0.09)	91.95 (+0.01)	92.65 (+46.72)	100 (+0)	75.77 (+2.63)	31.47 (+1.19)	66.58 (+2.32)	91.39 (-3.72)
ทับปุด	93.04 (+0.03)	91.48 (+0.12)	93.27 (+5.77)	98.8 (+0.01)	76.32 (+10.37)	33.15 (+5.78)	64.92 (+8.05)	90.88 (+5.15)
ท้ายเหมือง	86.85 (+0.72)	89.83 (+0.24)	75.69 (+4.56)	94.36 (-0.25)	73.48 (+2.59)	45.7 (+1.8)	63.52 (+3.87)	89.27 (+9.51)
จ.พังงา	90.76 (+0.19)	90.74 (+0.1)	85.63 (+18.29)	97.8 (+1.33)	67.91 (+5.95)	34.09 (+3.21)	55.55 (+3.05)	89.34 (+3.49)
เขต 11	78.56 (+4.79)	78.31 (+4.79)	40.10 (+4.11)	95.68 (-0.62)	63.12 (+3.38)	29.34 (+2.03)	49.73 (+2.3)	75.29 (+4.39)
ประเทศ	80.37 (+3.17)	80.53 (+3.28)	40.98 (+6.71)	87.77 (+0.42)	59.33 (+2.93)	25.11 (+1.51)	47.56 (+2.14)	72.33 (+3.19)



### แผนการขับเคลื่อนService Plan สาขา Stroke

พัฒนาศักยภาพ Stroke Corner ของ ร.พ.ตะกั่วป่า เป็น Stroke Unit

ขับเคลื่อนร.พ.พังงาและร.พ.ตะกั่วป่าประเมินมาตรฐาน SSCC

ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert, Stroke Awareness  
สู่สาธารณชน (Health Literacy ,EMS)

ประเมินและคัดกรอง CVD Risk ในกลุ่มเสี่ยงตามมาตรฐาน

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นร่วมกับการพัฒนา เครือข่าย 3 หมอ  
และร่วมกับ คปสอ.พขอ./พชต.

พัฒนาศักยภาพ Health Literacy เรื่อง HT ในกลุ่ม อสม.

### ประเด็นปัญหา

- Uncontrol HT/การขาดยา/รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ
- ไม่ได้รับการคัดกรอง
- การเข้าถึงบริการ EMS ต่ำกว่าเกณฑ์
- Health literacy (โรค,การใช้ระบบ EMS)
- กลุ่ม NCDs ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- พฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่

### ต้นน้ำ

- คัดกรองและให้ความรู้ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
- คัดกรอง CVD Risk ในกลุ่มเสี่ยงได้  $\geq 90$  % (89.34%)
- ตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  $\geq 80$  % (97.8%)
- ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  $\geq 60$  (55.55%)
- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.

### Small Success

### กลางน้ำ

- ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดrt-PA ภายใน 60 นาที  $\geq 70$  % (รอข้อมูล)
- พัฒนาระบบการส่งต่อผ่าน EMS 1669 (21.64%)
- พัฒนาศักยภาพ Stroke Corner ของ ร.พ.ตะกั่วป่าเป็น Stroke Unit

### ปลายน้ำ

- อัตราตายของผู้ป่วยStroke < 7% (12.31%)
- อัตราตาย Haemorrhagic Stroke < 25 % (39.68%)
- อัตราตาย Stenosis Stroke < 5% (5.24%)

### Stroke Death จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 (N = 41/333)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

หน่วยบริการ	จำนวน	ร้อยละ
รพ.ตะกั่วป่า	22(120)	18.33
รพ.พังงา	8 (58)	13.79
รพ.กะปงฯ	1 (14)	7.14
รพ.เกาะยาวฯ	0 (1)	0
รพ.ตะกั่วทุ่ง	0 (3)	0
รพ.คุระบุรีฯ	0 (7)	0
รพ.ทับปุด	0 (6)	0
รพ.ท้ายเหมืองฯ	0 (10)	0
รวม	31 (219)	14.19


ข้อมูลจาก HDC ณ 7 เมษายน 2565

หน่วยบริการ	จำนวน	ร้อยละ
รพ.ตะกั่วป่า	26 (161)	16.15
รพ.พังงา	13 (114)	11.44
รพ.กะปงฯ	1 (15)	6.67
รพ.เกาะยาวฯ	0 (1)	0
รพ.ตะกั่วทุ่ง	0 (8)	0
รพ.คุระบุรีฯ	1 (13)	7.69
รพ.ทับปุด	0 (10)	0
รพ.ท้ายเหมืองฯ	0 (11)	0
รวม	41 (333)	12.31

ข้อมูลจาก HDC ณ 1 มิถุนายน 2565



สรุปผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)จังหวัดพังงา



รายละเอียดในส่วนของผู้ป่วยรพ.ตะกั่วป่า ต.ค.64-กุมภาพันธ์ 65

1. ผู้ป่วยมีอาการ(Stroke awareness) ไม่เข้ารับการรักษาทันที (ขาดHL) รอจนอาการรุนแรงจึงนำส่ง รพ.
2. ผู้ป่วยรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ดื่มเหล้า ญาติไปเจอตอนเช้า
3. ผู้ป่วยมีประวัติดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ทุกวัน
4. ผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ป่วยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองตีบ
6. ผู้สูงอายุไม่เคยตรวจสุขภาพ
7. ผู้ป่วยต่างชาติ
8. ผู้ป่วยหยุดหายใจระหว่างส่งรักษาต่อ

- Uncontrol HT/การขาดยา/รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ (65.2%)
- ไม่ได้รับการคัดกรอง (45.64%)
- การเข้าถึงบริการ EMS ต่ำกว่าเกณฑ์
- Health literacy (โรค,การใช้ระบบ EMS)
- กลุ่ม NCDs ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- พฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่
- ผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี 12 ราย(29.26%)

